# インフルエンザHAワクチン予防接種予診票

任意接種用

※接種希望の方は、太ワク内をご記入ください。	診察前の	の体温	Л	复 分
住 所			TEL( )	_
フリガナ		1	明治 ・ 大正 ・ 昭	昭和 ・ 平成 ・ 令和
予防接種を受ける人の氏名	男 	<u></u>	年	月 日生
(保護者の氏名)	女 月 月 日			
質問事項	回答欄			医師記入欄
<b>見 同 季 頃</b> 今日受ける予防接種について説明文(裏面)を読ん				医卵配八侧
1 理解しましたか。	いいえ		はい	
今日受けるインフルエンザHAワクチンの予防接種は	いいえ ( )回目			
2 今シーズン1回目ですか。	前回の接種は( 月 日)		はい	
3 今日、体に具合の悪いところがありますか。	はい 具体的に(	)	いいえ	
4 現在、何かの病気で医師にかかっていますか。	はい 病名(	)		
・ その場合、治療(投薬など)を受けていますか。	はい・ いいえ		いいえ	
・ その病気の主治医には			いいへ	
今日の予防接種を受けてもよいと言われましたか	い。 はい・ いいえ			
5 最近1ヶ月以内に病気にかかりましたか。	はい 病名(	)	いいえ	
6 これまでに特別な病気(心臓血管系・腎臓・肝臓・				
血液疾患、免疫不全症、その他の病気)にかかり、	はい  病名(	)	いいえ	
医師の診察を受けましたか。				
7 これまで間質性肺炎や気管支喘息等の呼吸器系疾	患と はい ( )年( )月頃		いいえ	
診断され、現在、治療中ですか。	(現在治療中 ・ 治療していない	1)	0.0.7	
8 これまでにひきつけ(けいれん)を起こしたことがあり	ますか。 はい ( )回ぐらい		いいえ	
	最後は( )年( )月頃		0.0.7	
9 薬や食品(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんや	はい	$\neg$		
じんましんが出たり、体の具合が	薬または食品の名前		いいえ	
悪くなったことがありますか。	(	)		

15 (接種を受けられる方がお子さんの場合)
分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか。

16 その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことや
質問があれば、具体的に書いて下さい。

医師の記入欄:以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は ( 可能 ・ 見合わせる )と判断します。
本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応及び
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について

医師の署名又は配名押印

はい

はい

病名(

はい

はい 予防接種の種類(

はい 予防接種名・症状

10 近親者に先天性免疫不全と診断された方がいますか

11 1ヵ月以内に家族や周囲で麻しん、風しん、水痘、

おたふくかぜ、などにかかった方がいますか。

13 これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことが

12 1ヵ月以内に予防接種を受けましたか。

14 (女性の方に) 現在妊娠していますか。

ありますか。

説明した。

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果やも目的、副反応の可能性などについて 理解した上で接種を希望しますか。	本人の署名(もしくは保護者の署名)		
( 接種を希望します・ 接種を希望しません )	(代筆の場合:統柄 )		

使用ワクチン名・メーカー名	接種量	実施場所・医師名・接種日時		
インフルエンザHAワクチン	(皮下接種)	施場所		
	□0,25mL	医療法人社団 福生会 クリア西千葉駅クリニック		
Lot No.	(6か月以上3歳未満)	医師名		
	□0.5mL			
	(3歳以上)	接種日時 年 月 日 時 分		

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

)

)

## インフルエンザHAワクチンの予防接種について

インフルエンザHAワクチンの予防接種を実施するにあたって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、1-1の予診票に出来るだけ詳しくご記入下さい。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入下さい。

#### 【ワクチンの効果と副反応】

予防接種により、インフルエンザ感染を予防したり、症状を軽くすることができます。また、インフルエンザによる 合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応に関して、過敏症として発疹、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、そう痒、血管性浮腫が報告されています。接種部位の局所症状として、発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱、蜂巣炎が報告されています。精神神経系として、頭痛、一過性の意識消失、めまい、顔面神経麻痺等の麻痺、末梢性ニューロパチー、失神、血管迷走神経反応、しびれ感、振戦が報告されています。消化器系として、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退があり、筋・骨格系として、関節痛、筋肉痛、筋力低下が報告されています。その他の副反応として発熱、悪寒、倦怠感、リンパ節腫脹、咳嗽、動悸、ぶどう膜炎が報告されています。強い卵アレルギーのある方は、強い副反応を生じる可能性がありますので、必ず医師に申し出て下さい。

非常にまれですが、次のような重大な副反応が起こることがあります。①ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管性浮腫など)②急性散在性脳脊髄炎(ADEM): 通常、接種後数日から2週間以内に(まれに28日以内に)発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害などがあらわれる③脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎④ギラン・パレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)⑤けいれん(熱性けれいんを含む)⑥肝機能障害、黄疸⑦喘息発作⑧血小板減少性紫斑病、血小板減少⑨血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など)⑩間質性肺炎⑪皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿胞症⑰ネフローゼ症候群

上記症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害が生じた場合の救済については、 健康被害を受けた人または家族が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

#### 【予防接種を受けることができない人】

- 1. 明らかに発熱のある人(通常は37.5℃以上の人)
- 2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 3. 過去にインフルエンザHAワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人 なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を 仰いで下さい。
- 4. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

## 【予防接種を受けるにあたり、医師とよく相談しなければならない人】

- 1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 3. カゼなどのひきはじめと思われる人
- 4 . 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- 6 . 今までにけいれんを起こしたことがある人
- 7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことのある人
- 8. 妊娠の可能性のある人
- 9. 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患のある人

## 【予防接種を受けた後の注意】

- 1 . インフルエンザHAワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応が起きることがあります。 医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
- 2. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 3. 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、普段通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 4. 万一、高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。

インフルエンザHAワクチンの任意の接種については、ワクチンを適正に使用したにもかかわらず、その副反応により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合は、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて、救済手続きを行う制度があります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。問合せは右記のとおりです。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

URL: https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0020.html